اکٹیاریسی موسا (سمی سی فیوگا)

العارف دواء كاتعارف

اس دواء کی خصوصیات اور تمام علامات صرف عور توں میں پائی جاتی ہیں،اس لئے یہ صرف ان ہی کی دواء ہے۔ مر دول میں استعال نہیں ہوتی۔

اس دواء کی منفر دعلامت یہ ہے کہ اکثر در داور تکلیفات کا تعلق حیض کے خون کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے حیض کاخون زیادہ بہنے لگتا ہے ویسے در دبڑھنے لگتے ہیں اور جیسے جیسے وہ کم ہوتا ہے در د کم ہونے لگتے ہیں۔ در دحیض کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوتے۔ حیض کی خراب یا کثرت کی وجہ سے بہت کی تکلیفات ہیں۔ در دحیض کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوتے۔ حیض کی خراب یا کثرت کی وجہ سے بہت کی تکلیفات ہیدا ہوتی اور بڑھتی ہیں۔ یہ اس دواء کی عجیب علامت ہے۔ عموما در داخراج سے کم ہوتا ہے مگر اس کا بڑھتا ہے اور صرف خون حیض کے اخراج کے زمانہ میں ہی ہوتا ہے۔ شدید ترین ذھنی علامات، گھٹیاوات کی شدید ترین علامات، انتہائی شدت کے جھٹے ، اعضاء میں اینٹھن ، در دکم ، سر دی زیادہ لگنا، مرگی ، تمام بدن میں دکھن ، در دکم ، سر دی زیادہ لگنا، مرگی ، تمام بدن میں دکھن ، در دکم ، سر دی زیادہ لگنا ، مرگی ، تمام بدن میں دکھن ، در دسر اور بے خوابی صرف حیض کے زمانہ میں ہی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ انتہائی پر در دحیض ہے۔

پلسائیلا، سیپیا کی طرح اس دوا_ء میں بھی رحم کی بہت سی علامات ملتی ہیں۔اس لئے جزوی طور پر حیض کے دنون کی تکلیفات میں اس دوا_ء کو استعال کیا جاسکتا ہے۔

اس دواء کی علامات پلیاٹیلا کی طرح بدلتی رہتی ہیں۔ ابھی درد تھے اور کچھ دیر بعد مثلی شروع ہو گی، کبھی ادھر درد تو کبھی ادھر درد ہونا، ابھی ہسٹیریا کی مریضہ تھی توابھی حاملہ بھی ہو گئی ہے۔

یہ دواء دوران حمل نے کے بارے مفید ہے خصوصاجب مریضہ کامزاج ہی اکٹیار لیی موسا ہو۔

دماغی علامات

مرایک چیز کاتاریک پہلودیکنے والی اور مرکام کے متعلق پہلے منفی سوچ۔

یا گل ہو جانے کاخوف۔ موت کاخوف۔

صرف اپنی ہی بات منوانے والی ، بیراس دواء کی مرسزی دماغی سب سے

بڑی علامت ہے۔

عممگین<u>۔ اور روتے ہوے ہانیں کرنا۔</u> گرم آمیں بھرنا۔ غم حرکت، جوش، سردی،اور خوف سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محسوس کرناکے تمام جسم پر سیاہ رنگ کا بادل چھایا ہوا ہے۔ سر پر سیسہ جبیسا بھاری بو جھ پڑا ہوا ہے۔

بہت زیادہ لڑا کی۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش۔ برداشت کی کمی۔ بست ہمت۔ غصہ ور۔

ا نتها کی باتونی، مریضه مروقت بولتی مرر ہتی ہے اور موضوع بدلتی رہتی ہے۔ جسمانی اور ذھنی حالتیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ دوسری علامات بھی ادل بدل کرظام رہوتی ہیں۔

نازك مزاج_شكى مزاج_جوشلى_پست جمت اور بزدل (پلسائيلا)_

دماغی علامات دوران حیض بڑھ جاتی ہیں۔

کسی بات پر بھی خیال جانے کی رغبت کانہ ہونا۔

خواہش و نفرت

کھٹی اور ٹھنڈی اشیاء کھانے کی عادت۔

المات عامه

بائیں جانب۔ بائیں خصیہ کادر د،اور بائیں پستان کادر د۔ بائیں بازو کی بے قاعدہ مسلسل حرکت۔ زیادہ تر بائیں حصص کامبتلاء مرض ہونا۔

سر د مزاج: ہمیشہ سر دی سے کانپتے رہنا، سر دی کااثر جلدی ہو نا۔ مر طوب موسم بر داشت نہیں ہوتا۔ مگر در د سر کھلی ہوااور سر دی سے کم ہوتا ہے۔ در د سر گرم مکان میں بڑھ جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا جسم میں داخل ہوتی محسوس ہوتی ہے،اسی لئے مریضہ کواس سے تکلیف ہوتی ہے۔

آرام پسند_آرام كرنے سے تكليفات كم اور حركت سے بڑھتى ہيں۔

دن پیند: علامات رات کوبڑھتی ہیں۔ بازوؤں اور جوڑ بندوں میں رات کو در د ہو تا ہے۔ مگر ر خساروں کااعصابی در درات کور فع ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت بھی تکلیفات بڑھتی ہیں۔

سانس کی تنگی جو کچھ کھانے سے کم ہو جائے۔ کھانے سے تکلیفات کا کم ہونا۔

مرماه مخصوص دنوں میں تکلیفات کا بڑھنا۔

حیض کاسیلان جتنازیادہ ہوتے جاتا ہے تمام تر تکلیفات اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔

جسمانی ساخت

خوبصورت پلیله جسم _

* جسمانی علامات

کمزوری دن 11 بج بخار کااحساس (رسٹاکس) به نا قابل بر داشت در د خصوصا در دسر ہوا کرتے ہیں۔

حیض کاسیلان جتنازیادہ ہوتا جاتا ہے، تکلیفات اتن زیادہ ہوتی ہیں۔ حیض کے شروع ہونے سے 15 دن قبل ہی درد شروع ہوجاتے ہیں، اور جیسے جیسے حیض کاخون جاری ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تکلیفات بڑھتی جاتی ہیں۔ جب خون رک جاتا ہے تو درد کم ہوجاتے ہیں۔اس علامت کو اس دواء کی سب سے بڑی کلیدی علامت مانا گیا ہے۔اکثر اس علامت کی بنیاد پر اس دواء کا انتخاب ہوتا ہے۔

حیض کے خون کا اخراج بہت زیادہ ہو نا۔ حیض کے دنوں میں سر پر بہت بھاری بن اور خون کا اجتماع۔

تیسرے اور ساتویں ماہ میں اسقاط حمل کار جحان (سبائنا)۔

وہ عور تیں جن کے ہمیشہ بچے مر دہ پیدا ہوتے ہوں وہ عمومااکٹیاریسی موسا ہوا کرتی ہیں۔

یہ دوا_ء خواتین کے لئے بہت مفیداور حیض کادر دکم کرنے والی ہے۔اگر کسی عورت کو حیض زیادہ مقدار میں آرہا ہو توبیہ دواء اس کی مقدار کو کم کر دے گی۔

ا گرایلو پیتھک انجیکشن سے حیض رک جائے تو یہ دواء اس کو جاری کردے گی اور اس کے اثرات بد کو رفع کردے گی۔ اس میں وجع المفاصل کار جمان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ در دبیلی کے جھکے کی طرح کبھی ایک عبگہ اور کبھی دوسری جبگہ ہونا۔ رحم اور سینہ کے در د کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب ہوتے ہیں۔ رحم کے مقام پرتیز در دجو کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب ہو۔ رحم کے مقام پر بھاری پن اور نیچے دبانے والے در د (سیپیا، پلساٹیلا) وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا۔

جذبات کے زوریاسر دی کی وجہ سے یاد باؤسے اعصاب میں جھکے۔ مریضہ رات کو جس بھی کروٹ پر د باؤڈال کرلیٹتی ہے ،اس عصبہ میں جھکے ہونے لگتے ہیں۔

خون کی کئی۔ بے خوابی۔ حیض کی مقدار کثیر ہونا۔ رحم کی امراض کی ہمدردی میں ہونا والا درد کمر۔ سن یاس میں بائیں پستان کے بینچے درد۔ گردن اور کمر کے عضلات میں بائی کے در داور اکڑن کا احساس (رسٹاکس)۔

استعال:

پلیاٹیلا، سپیا، کیلیم گرینم، نیٹرم میور،اورا گنیشیااس کی معاون ادویہ ہیں۔

200 اور 10 نیزانچی طاقتوں سے اچھار زلٹ حاصل ہوا ہے۔ وہ بھی ایک خوراک سے۔ مگر پہلے کی 10 اور دوسر پوٹینسی کی 4 ڈوز مکمل کرنی چاہئے۔

ہو میو ڈاکٹر ماجد حسین صابری

03494143244

Monday, September 26, 2022

520

دوستواگر مضمون اچھالگا تواپنا فیڈ بیک ضرور دینااور اس کالنگ اپنی فیس بٹ پر شئر بھی کرنا۔ ڈونلوڈ لنگ دائیں جانب (PDF) پر موجود ہے۔PDF پر کلک کرکے مضمون ڈونلوڈ کر سکتے ہیں۔